

Indications pour la planification des récoltes de betteraves

De nombreux planteurs observant leurs parcelles de betteraves brunes et sèches se demandent à partir de quel niveau de qualité il est encore possible de récolter les betteraves. Si chaque producteur doit finalement décider pour chaque parcelle si la récolte en vaut la peine, ce communiqué vise à fournir des repères afin de faciliter cette prise de décision. Pour les champs où le feuillage des betteraves est encore vert, la récolte est généralement la meilleure solution.

La campagne d'arrachage va débuter sur des parcelles ayant passablement souffert cette saison. Cette année plus que jamais, l'arrachage des betteraves doit avoir lieu juste avant la date de transport afin de limiter les risques de propagation de pourriture des betteraves endommagées lors du stockage en tas (due par exemple au charançon ou à la teigne).

Aide à la décision

Nous recommandons aux producteurs de procéder comme suit : récolter à la main 100 betteraves par parcelle et les examiner pour détecter la pourriture humide, vérifier leur taille (diamètre) et leur poids.

- Les livraisons de betteraves présentant un **pourcentage de pourriture humide ne dépassant pas 15 %** peuvent être transformées par Sucre Suisse SA. Au-delà de ce pourcentage, la transformation n'est plus possible. Les galeries sèches causées par le charançon de la betterave ne posent aucun problème pour la transformation (voir communiqué du 13 août 2026).
- **Les betteraves d'un diamètre supérieur ou égal à 6 cm** peuvent être récoltées normalement. Pour les petites betteraves, il faut s'attendre à une part de tare totale élevée (pierres y compris). Sucre Suisse SA ne déconseille que les betteraves soient récoltées lorsque des adaptations sont faites sur l'arracheuse ou qu'une autre machine de récolte permettant de récolter des betteraves très petites (< 6 cm) est utilisée. Les risques pour la logistique et la transformation sont trop importants. La tare totale est réglée dans l'Accord interprofessionnel.
- La récolte **de champs bruns, complètement secs et dépourvus de feuillage vert** n'est généralement plus rentable, car la teneur en sucre, extractibilité et le rendement de betteraves sont trop faibles. Une exception peut être faite pour les champs qui ne sont desséchés que depuis quelques semaines et/ou qui atteignent un poids moyen de betterave supérieur à 400 g par betterave.
- **ATTENTION : les betteraves qui ne sont pas récoltées doivent être retirées du champ ou détruites mécaniquement dans leur intégralité** afin d'éviter d'importants problèmes liés aux repousses de betteraves dans la culture suivante. Les betteraves « Smart », résistantes aux sulfonilurées, sont particulièrement problématiques. La destruction complète de la betterave doit être visée afin que celle-ci pourrisse par la suite et ne puisse plus germer. Une solution consiste à utiliser un gyrobroyeur suivi d'une herse à disques. Un travail du sol lent (max. 3 km/h) mais intensif avec une fraise réglée à faible profondeur est une autre variante.

Aspects financiers

- **La prime à la culture particulière et les contributions au système de production** sont versées même en cas d'abandon de la culture dû à un événement exceptionnel, comme cette année.
- Les producteurs et productrices assurés doivent déclarer les dommages et les pertes de rendement à leur assurance. Certaines **assurances sécheresses réduisent le taux de couverture** en cas de non-récolte (par exemple, de max. 60 % -> 45 %) et lors d'attaques de charançons.
- Les **conditions de prise en charge ainsi que les déductions** liées à la teneur en sucre et à la tare totale sont régies par l'Accord interprofessionnel.
- Nous remercions tous les producteurs et toutes les productrices pour leur engagement et leur coopération dans cette situation exceptionnellement difficile.

Contrats et transformation

Bureau des betteraves d'Aarberg, Sucre Suisse SA

betteraves@sucre.ch

032 391 62 29

Culture

Centre betteravier suisse

info@betterave.ch

021 557 99 09

Questions générales

Fédération suisse des betteraviers

info@svz-fsb.ch

056 462 50 26

Exemples : état des parcelles et rentabilité de la récolte

La semaine dernière, le Centre Betteravier Suisse a prélevé des échantillons et analysé 16 parcelles en collaboration avec la Sucre Suisse SA. Les données ci-dessous sont basées sur ces échantillons.

Champs bruns, complètement desséchés, sans aucun feuillage vert (bruns depuis juillet) :

La récolte n'est généralement pas rentable.

La récolte n'est généralement pas rentable si le champ est brun depuis début juillet. Une récolte peut toutefois être envisagée si le poids moyen des betteraves est supérieur à 400 g par betterave.



Henniez (VD)



Opplingen (BE)



Trasadingen (SH)

Champs présentant peu de feuillage vert ou uniquement des pétioles verts :

Récolte économiquement rentable sous certaines conditions.


Évaluer la situation globale : les dégâts causés aux betteraves par la teigne ou le charançon jouent un rôle important. En cas de forts dégâts de charançon (plus de 50 % de la surface de coupe de la betterave), la récolte n'est généralement pas rentable.



Grandfontaine (JU)



Borex (VD)



Dommages causés par les charançons sur la surface de coupe

Champs au feuillage vert (sec ou vigoureux) :

Récolte rentable (comme les autres années).



Ostermundigen (BE)



Radelfingen (BE)



Baumes (VD)

Contrats et transformation

Bureau des betteraves d'Aarberg, Sucre Suisse SA

betteraves@sucre.ch

032 391 62 29

Culture

Centre betteravier suisse

info@betterave.ch

021 557 99 09

Questions générales

Fédération suisse des betteraviers

info@svz-fsb.ch

056 462 50 26